

Granulat na myszy i szczury Bros 100 g



Cena: 3,39 PLN

Opis słownikowy

Ilość w opakowaniu zbiorczym 20 sztuk

Producent Bros

Opis produktu

Granulat na myszy i szczury Bros 100 g

Marka

Bros

Cechy

z aromatem zboża, właściwości mumifikujące, skuteczność w 1 dawce, wykładanie trutki bez jej dotykania

Marka standaryzowana

Marka: Bros

Adres kontaktowy

ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

Opis produktu

Saszetka gotowa do użycia (nie rozrywać). Gryzonie bez trudu potrafią przegryźć saszetkę i dostać się do trutki. Nowoczesne rozwiązanie polegające na pakowaniu granulatu w pojedyncze saszetki sprawia, że zapachy z zewnątrz nie są przenoszone na trutkę, dzięki czemu jest ona bardziej atrakcyjna dla gryzoni. Dodatkowo saszetka chroni przed rozsypywaniem się produktu i ogranicza dostęp do niego dzieciom i zwierzętom domowym. Bros granulat na myszy i szczury. Przynęta gotowa do użycia. Granulat w saszetkach do zwalczania myszy i szczurów wewnątrz oraz szczurów wokół budynków. Zawiera silnie wabiącą przynętę i wykazuje skuteczność już po jednokrotnym spożyciu. Działa z kilkudniowym opóźnieniem, dzięki czemu szkodniki nie kojarzą trutki ze śmiercią innych osobników. Posiada właściwości mumifikujące i zawiera barwnik oraz gorzką substancję zniechęcającą ludzi i zwierzęta domowe do spożycia. Wyjątkowo atrakcyjny dla gryzoni dzięki aromатовi zboża.

Pozostałe informacje

Masa pojedynczej porcji: 20 g

Kontakt

BROS Sp. z o.o. sp.k.

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: Stosować w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc występowania gryzoni: ścieżki wędrowek, nory, miejsca gnieźdzenia się, otwory, miejsca karmienia zwierząt hodowlanych. Saszetki z przynętą (nie należy wyjmować przynęty z saszetki) umieścić

w stacjach deratyzacyjnych, zabezpieczonych przed zalaniem, niepożądanym otwarciem i tam gdzie to możliwe przytwierdzonych do podłoża lub innych struktur. Mysz domowa: stosować 60 g. Szczur wędrowny: stosować 100 g. Jeżeli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna: w przypadku wysokiej infestacji stosować min. co 5 m, w przypadku niskiej infestacji stosować min. co 10 m. Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (na początku okresu zwalczania, przynajmniej: myszy co 2 - 3 dni, szczurów co 5 - 7 dni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać zjedzoną przynętę, wymieniać tę uszkodzoną przez wodę i zanieczyszczoną, wyszukiwać i usuwać padłe gryzonie stosując rękawice ochronne lub narzędzia np. szczypce. W celu zwiększenia spożycia przynęty oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa ponownej infestacji należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze (np. zatykanie otworów, usuwanie potencjalnych źródeł pokarmu dla gryzoni). Przed zastosowaniem należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń zamieszczonych w materiałach informacyjnych dołączonych do produktu lub informacji przekazanych w punkcie sprzedaży oraz rozważyć zastosowanie niechemicznych metod kontroli (np. pułapek). Należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla gryzoni (np. rozsypane ziarno itp). Przed zastosowaniem nie należy ingerować w środowisko bytowania gryzoni, gdyż może mieć to wpływ na zachowanie zwierząt i spożycie przynęty.

Rodzaj przechowywania

Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Środki ostrożności: Uwaga H373 Może powodować uszkodzenie narządów (krew) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. P102 Chronić przed dziećmi. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. P260 Nie wdychać pyłu. P280 Stosować rękawice ochronne. P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość / pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. Stacje deratyzacyjne należy umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych i hodowlanych i zwierząt innych niż docelowe. Nie stosować w pobliżu żywności, napojów, pasz, przyborów kuchennych i powierzchni mających z nimi kontakt. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Po zastosowaniu produktu umyć ręce wodą z mydłem. Nie umieszczać stacji w pobliżu miejsc, w których mogą mieć kontakt z wodami powierzchniowymi. Nie należy stosować produktu w zabiegach z przynętą wykładaną w sposób ciągły (np. w celu zapobiegania intestacji lub wykrycia ich aktywności).

Zabezpieczyć przynętę przed wynoszeniem. Ze względu na mechanizm działania substancji aktywnej skutki zastosowania produktów można zaobserwować (gryzonie giną) po upływie 4 - 10 dni po spożyciu przynęty. Gryzonie powinny zostać zwalczone w ciągu 35 dni. Jeśli po tym okresie aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy powiadomić dostawcę / sprzedawcę produktu lub skonsultować się z profesjonalną firmą zajmującą się deratyzacją. Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć stacje deratyzacyjne oraz przynętę znaną poza stacjami. Pierwsza pomoc: Kontakt ze skórą: spłukać skórę wodą, a następnie umyć wodą i mydłem. Kontakt z oczami: wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli dotyczy, przemyć oczy roztworem do przepłukiwania oczu lub wodą, a następnie utrzymać powieki otwarte przez co najmniej 10 minut. Kontakt z jamą ustną: ostrożnie przepłukać jamę ustną wodą. Nigdy nie podawać niczego doustnie nieprzytomnej osobie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać opakowanie produktu lub etykietę. W przypadku spożycia produktu przez zwierzę domowe należy skontaktować się z lekarzem weterynarii. Antidotum: witamina K1 podawana wyłącznie przez personel medyczny / weterynaryjny. Skutki uboczne działania niepożądane: produkt zawiera substancję należącą do grupy antykoagulantów. W przypadku spożycia objawy mogą wystąpić z opóźnieniem i obejmują krwawienie z nosa i z dziąseł. W ciężkich przypadkach może dochodzić do powstawania siniaków oraz obecności krwi w kale i moczu. Stacje deratyzacyjne należy oznakować zgodnie z zaleceniami. Oznakowania muszą zawierać następujące informacje: "Nie przenosić ani nie otwierać"; "Zawiera substancję gryzoniobójczą"; "Nazwa produktu lub nr pozwolenia"; "Substancja czynna" i "W razie wypadku skontaktować się z ośrodkiem kontroli zatruć (Gdańsk (58) 682 04 04, Kraków (12) 411 99 99, Poznań (61) 847 69 46, Warszawa 607 218 174)". Środki ochrony środowiska: W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska, należy go zebrać (mechanicznie) unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (spalarnie). Produkt niebezpieczny dla dzikich zwierząt. Opakowania po produkcie, pozostałości produktu (w tym przynętę znaną poza stacją deratyzacyjną), zamknięte w oznakowanym pojemniku oraz padłe gryzonie, usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać z odpadami komunalnymi. Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Chronić przed światłem. Długość okresu przechowywania: do 2 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej. Substancja czynna: bromadiolon 0,0029 g/100 g związek z grupy antykoagulantów. Nr pozwolenia: PL/2017/0237/MR. Do stosowania przez

użytkowników powszechnych.

Języki na opakowaniu
polski

Regulacje CLP
zagrożenie dla zdrowia: Brak hasła ostrzegawczego

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Granulat na myszy i szczury

Galeria

