

Granulat na Ślimaki Snacol 3GB 1,1 kg



Cena: 27,14 PLN

Opis słownikowy

Ilość w opakowaniu zbiorczym 6 sztuk

Producent Bros

Opis produktu

Środek przeznaczony do stosowania ręcznie, poprzez aplikację bezpośrednią z opakowania lub za pomocą aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin. Należy go aplikować równomiernie na całej powierzchni gleby między roślinami i wzdłuż brzegów zagonów. Nie posypywać roślin uprawnych.

Stosowanie środka:

Truskawka (w uprawie polowej)

ślimaki nagie

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7g/10 m².

Termin stosowania: środek stosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód wyrządzonych przez te szkodniki, w okresie rozwoju i dojrzewania owoców truskawki.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Kapusta głowiasta (w uprawie polowej, w uprawie szklarniowej i pod osłonami)

ślimaki nagie

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7g/10 m².

Termin stosowania: środek stosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód wyrządzonych przez te szkodniki, od 7 dni przed siewem lub sadzeniem roślin do fazy początku rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Sałata, szpinak, seler liściowy i inne warzywa liściowe (w uprawie polowej, w uprawie szklarniowej i pod osłonami)

ślimaki nagie

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7g/10 m².

Termin stosowania: środek stosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód wyrządzonych przez te szkodniki, od 7 dni przed siewem lub sadzeniem roślin do fazy, gdy zostanie osiągnięte 10% masy liściowej charakterystycznej dla danej odmiany.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Funkia, aksamitka i inne rośliny ozdobne (w uprawie polowej i pod osłonami)

ślimaki nagie i wstężyk ogrodowy (ślimak oskorupiony)

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7g/10 m².

Termin stosowania: środek stosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód wyrządzonych przez te szkodniki.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

UWAGA: Informacje o środkach ostrożności, okresach karencji i szczególnych warunkach stosowania znajdują się na opakowaniu.

Przed użyciem preparatu należy zapoznać się z pełną treścią etykiety, która znajduje się na opakowaniu.

Uwaga!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informację zamieszczoną w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć zamówienie oraz być umową sprzedaży mogą jedynie Klienci pełnoletni będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).

Sprzedawca posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków nr 30/19/20964 z dnia 2020-11-06

Galeria

