

Granulat na Ślimaki Snacol 3GB 2,1 kg



Cena: 43,68 PLN

Opis słownikowy

Ilość w opakowaniu zbiorczym 4 sztuki

Producent Bros

Opis produktu

Granulowany preparat o działaniu żołądkowym i kontaktowym do zwalczania ślimaków w niektórych uprawach rolniczych oraz roślinach ozdobnych. Dzięki zawartości dodatków nęcących wabi ślimaki i skutecznie je likwiduje.

Preparat jest odporny na wilgoć, dzięki czemu pozostaje atrakcyjny dla ślimaków przez długi czas, gwarantując skuteczne i długie działanie.

UWAGA: Pełna treść instrukcji użycia produktu znajduje się na opakowaniu. Należy zapoznać się ze sposobem użycia produktu opisanym na opakowaniu przed jego użyciem.

Środek przeznaczony do stosowania ręcznie, poprzez aplikację bezpośrednią z opakowania lub za pomocą aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin. Należy go aplikować równomiernie na całej powierzchni gleby między roślinami i wzdłuż brzegów zagonów. Nie posypywać roślin uprawnych.

Stosowanie środka:

Truskawka (w uprawie polowej)

ślimaki nagie

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7g/10 m².

Termin stosowania: środek stosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód wyrządzonych przez te szkodniki, w okresie rozwoju i dojrzewania owoców truskawki.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Kapusta głowiasta (w uprawie polowej, w uprawie szklarniowej i pod osłonami)

ślimaki nagie

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7g/10 m².

Termin stosowania: środek stosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód wyrządzonych przez te szkodniki, od 7 dni przed siewem lub sadzeniem roślin do fazy początku rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Sałata, szpinak, seler liściowy i inne warzywa liściowe (w uprawie polowej, w uprawie szklarniowej i pod osłonami)

ślimaki nagie

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7g/10 m².

Termin stosowania: środek stosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód wyrządzonych przez te szkodniki, od 7 dni przed siewem lub sadzeniem roślin do fazy, gdy zostanie osiągnięte 10% masy liściowej charakterystycznej dla danej odmiany.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Funkia, aksamitka i inne rośliny ozdobne (w uprawie polowej i pod osłonami)

ślimaki nagie i wstężyk ogrodowy (ślimak oskorupiony)

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7g/10 m².

Termin stosowania: środek stosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód wyrządzonych przez te szkodniki.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

UWAGA: Informacje o środkach ostrożności, okresach karencji i szczególnych warunkach stosowania znajdują się na opakowaniu.

Przed użyciem preparatu należy zapoznać się z pełną treścią etykiety, która znajduje się na opakowaniu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.