

Środek owadobójczy Benevia 100 OD Sumin 50 ml



Cena: 62,22 PLN

Opis słownikowy

Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 sztuk
Producent	Sumin

Opis produktu

SKUTECZNA OCHRONA PRZED POŁYŚNICĄ MARCHWIANKĄ

Dlaczego warto wybrać BENEVIA®?

- zwalcza trudne szkodniki
- wykazuje długi okres działania do 3 tygodni
- wyróżnia się szybką skutecznością zatrzymanie żerowania w kilkanaście minut
- jest odporny na zmywanie
- jest łatwo biodegradowalny brak pozostałości

INSEKTYCYD w formie koncentratu zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa w sposób węlbny oraz translaminarny.

Jak działa na szkodniki?

- paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika

- ostateczny efekt działania widoczny jest po 3-6 dniach od zabiegu
- produkt ma wpływ na różne stadia rozwojowe wielu gatunków szkodników
- wczesne stosowanie na początku nalotu powoduje zahamowanie płodności szkodników dorosłych, redukuje liczbę składanych jaj (niektóre szkodniki) i kontroluje stadia pośrednie
- dzięki temu pozwala powstrzymać szkodniki poniżej progów szkodliwości

Skład produktu:

cyjanotraniliprol (związek z grupy antranilowych diamidów) – 100 g/l (10,26%)

Jakie szkodniki zwalcza?



Połyśnica marchwianka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 ml/100m²

Kiedy? od fazy pierwszego liścia do końca fazy dojrzewania nasion

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, w czasie wylotu pierwszych muchówek.

Zalecana ilość wody: 3-10 l/100 m².

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zabiegów wskazanych w dalszej części etykiety)



Śmietka cebulanka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 ml/100m².

Termin stosowania: od fazy dwóch liści do początku fazy dojrzałości zbiorczej (BBCH 12-80). Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika w czasie wylotu pierwszych muchówek.

Zalecana ilość wody: 2-8 l/100 m².

Stosować z dodatkiem adiuwanta olejowego.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni



Kwieciak malinowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 ml/100m²

Kiedy? od fazy drugiego liścia do fazy dojrzałości zbiorczej (BBCH 12 - 89). Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika w czasie wylotu chrząszczy.

Zalecana ilość wody: 3-10 l/100 m².

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zabiegów wskazanych w dalszej części etykiety)

Uwaga!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.