

Środek owadobójczy Emulpar Spray Target Natural 750 ml



Cena: 17,81 PLN

Opis słownikowy

Ilość w opakowaniu zbiorczym	14 sztuk
Producent	Tamark S.A.

Opis produktu





Cechy:

- zwalcza ochojniki, tarcznieki, mączliki, mszyce i przędziorki
- fizycznie eliminuje szkodliwe owady i roztocza tj. mszyce, przędziorki, miseczniki
- naturalny produkt na bazie oleju rydzowego
- gotowy do użycia
- nietoksyczny, bezpieczny dla środowiska, ludzi i zwierząt

Gotowy do użycia preparat do fizycznego eliminowania szkodliwych owadów i roztoczy takich jak: mszyce, przędziorki, miseczniki, mączliki, wciornastki, miodówki, czerwce oraz formy zimujące niektórych szkodników.

Preparat stosuje się do ochrony roślin ozdobnych, warzywnych i owocowych uprawianych w domu, na balkonie lub w ogrodzie. Można go stosować interwencyjnie i zapobiegawczo.

Środek powstał na bazie roztworu z naturalnego oleju rydzowego uzyskanego z Inianki (Inicznik siewny - *Camelia sativa*). Można go stosować przez cały okres wegetacji.

Zabezpiecza rośliny iglaste przed brązowaniem. Stosowany w okresie późnozimowym oraz na przedwiośniu tworzy mechaniczną barierę zabezpieczającą przed utratą wody w wyniku "wysmagania" roślin mroźnym wiatrem.

Preparat należy stosować w formie oprysku, po wykryciu obecności szkodników (lub zapobiegawczo) bezpośrednio na powierzchnię rośliny. Wszystkie części rośliny powinny być pokryte cieczą, również spody liści.

Po zetknięciu z organizmem szkodnika otacza go lepkiem śluzem, który blokuje jego funkcje życiowe, m.in. oddychanie, poruszanie się oraz żelowanie. W konsekwencji, po kilku dniach owad ginie. Aby środek mógł znacznie wpłynąć na ograniczenie żerowania szkodników należy stosować go regularnie.

Nie posiada okresu karencji i prewencji.

Jest nieszkodliwy dla pszczoł, nietoksyczny i biodegradowalny Jego skład jest w pełni naturalny i bezpieczny dla środowiska, ludzi i zwierząt.


Dawkowanie preparatu na szkodniki:



drzewa i krzewy owocowe, warzywa, rośliny ozdobne, zioła

Opryskiwanie : po wykryciu obecności szkodników (lub zapobiegawczo) bezpośrednio na powierzchnię rośliny. Wszystkie części rośliny powinny być pokryte cieczą, również spody liści.

Kiedy stosować Emulpar?



Galeria

