

# Środek owadobójczy Lepinox Plus Sumin 15 g

Cena: 17,81 PLN



## Opis słownikowy

Ilość w opakowaniu zbiorczym	15 sztuk
Producent	Sumin

## Opis produktu

Lepinox Plus to biologiczny insektycyd

Substancja czynna: *Bacillus thuringiensis* subsp. kurstaki, szczep EG 2348

Insektycyd przeznaczony do biologicznego zwalczania gąsienic motyli. Środek w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie. Zawiera naturalnie występującą na roślinach oraz w glebie bakterię *Bacillus thuringiensis*, wytwarzającą krystaliczne białka, które aktywowane są w przewodzie pokarmowym gąsienic. Zainfekowane owady zaraz po spożyciu bakterii przestają żerować i giną w ciągu 72 godzin, a z czasem kurczą się i czernieją.

Okres od ostatniego zastosowania Lepinox Plus do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): środka nie stosować w dniu zbioru.

W przypadku wystąpienia opadów do 48 h po aplikacji, zabieg należy powtórzyć.

Nie mieszać środka z produktami o silnie alkalicznym pH, mieszanina nie powinna przekroczyć pH 8,0.

### Zalety:

- brak pozostałości i okresu karencji
- dozwolony do stosowania w uprawach ekologicznych
- bezpieczny dla organizmów pożytecznych, ludzi i środowiska
- odpowiedni w strategii przeciwdziałania wykształcania odporności na insektycydy
- zwalcza gąsienice atakujące warzywa kapustne

#### Stosowanie:

##### Jabłoń

zwójkówki liściowe

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>/2,5 – 5 l wody

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

##### Pomidor pod osłonami

słonecznica orężówka, gąsienice motyli sówkowatych, skośnik pomidorowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>/4 – 6 l wody

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowania małoobszarowych:

##### Papryka, sałata, ogórek (w gruncie i pod osłonami)

światłówka naziemnica, gąsienice motyli sówkowatych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>/3 – 8 l wody

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

##### Kapusta głowiasta, kalafior, brokuł (w gruncie)

piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinek kapustnik

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>/3 – 5 l wody

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

##### Cukinia, fasola (w gruncie)

słonecznica orężówka, gąsienice motyli sówkowatych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>/3 – 6 l wody

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

##### Truskawka (w gruncie i pod osłonami)

gąsienice motyli sówkowatych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>/4 – 6 l wody

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

#### **Grusza**

zwójka rdzaweczka, gąsienice zwójkówki liściowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>/2,5 – 5 l wody

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

#### **Brzoskwinia, nektaryna**

owocówka południóweczka, skośnik brzoskwiniaczek

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>/2,5 – 5 l wody

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

#### **Winorośl**

zwójka krzyżóweczka, zwójka kwasigroneczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>/4 – 6 l/ wody

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

#### **Bukszpan**

oprysk Lepinox Plus na ćmę bukszpanową

ćma bukszpanowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g/100 m<sup>2</sup>/4 – 6 l wody

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni